

Protokoll für Parkinsonpatient: Datum: Klinik-Fachbereich: Pflegeeinrichtung häuslicher Bereich

Patient hat: orale Medikamente Pflaster THS (Schrittmacher) Pumpentherapie Duodopa Apomorphin Apomorphin/Pen,

Patient ist: mobil ohne Hilfe, benötigt Hilfe bei allen Tätigkeiten, teilweise beim ist bettlägerig

Nur Parkinsonmedikamente: wichtig: pünktlich geben, da sonst Wirkungsschwankungen eintreten können!!!

Uhrzeit Stunde	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5
hier Minuten der Gabe angeben																								
Parkinson-Bedarfsmedikamente																								

Verschiedene Medikamente können die Wirksamkeit von Parkinsonmedikamenten beeinflussen!!! Siehe Infoblatt: Wichtige Info Morbus Parkinson Pat. hat: Neuroleptika Antibiotika

Parkinsonpatient: _____ Datum: _____ Datum _____

Therapien: KG von bis Physiotherapie von bis , Logopädie von bis , OP/Untersuchungen von bis

Mobilisation von bis , von bis , von bis sonstiges: _____ von bis

Patient ist nüchtern von bis , Medikamentenpause von bis

Sondennahrung: ml von bis / ml von bis / Trinkmenge: ml, / Nahrungsergänzung (oral): ml

Bewegung: normal/gut beweglich=1, überbeweglich(hyperkinetisch): Skala von leicht=2 bis sehr stark=5 (evtl. Überdosierung) Medikamente anpassen
 unbeweglich(akinetisch): Skala von leicht =6 bis total=9 (total unbeweglich, evtl. akinetische Krise=intensivpflichtig!!!) Bedarfsmedikation geben!!! / Medikamente anpassen

Uhrzeit Stunde	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5
hier Minute der Gabe angeben																								
Bewegung (siehe Skala)																								
Tremor (wenn ja=x)																								
Verwirrtheit (wenn ja=x)																								
Halluzination (wenn ja=x)																								
Andere Auffälligkeiten benennen:																								
Stuhlgang (wenn ja=x)																								
Mahlzeiten (wenn ja=x)																								

Körperliche und psychische Belastungen, Infekte, sowie Nahrungsmittel(z.B. Eiweiß) können Einfluss auf die Wirksamkeit der Parkinsonmedikamente nehmen . Evtl. Bedarfsmedikation geben!!!

Auf Blutdruck achten!!! Siehe auch Infoblatt: Wichtige Info Morbus Parkinson

Blutdruck:: Zeit=Z /Wert =RR /Puls=P Z RR P Z RR P Z RR P